



SOSYAL PEDIATRİ DERNEĞİ YAŞINA GÖRE RUTİN AŞILARI TAM OLAN SAĞLIKLI ADOLESANLAR İÇİN AŞILAMA ÖNERİLERİ-22 OCAK 2026

(Bu tablo derneğimizin BAĞIŞIKLAMA ÇALIŞMA GRUBU üyeleri tarafından hazırlanmıştır.)

Emel GÜR, Meda KONDOLOT, Filiz ORHON, Gonca KESKİNDEMİRCİ, Meltem DİNLEYİCİ, Feyza KOÇ, Ahmet ERGİN

AŞILAR	9 yaş	10 yaş	11 yaş	12 yaş	13 yaş	14 yaş	15 yaş	16 yaş	17 yaş	18 yaş
Td/Tdab ¹					1 doz					
HPV ²	6 ay arayla 2 doz						0, 2., 6.aylar olarak 3 doz			
İnfluenza ³	İnfluenza sezonunda her yıl, tek doz olarak									
Men ACWY ⁴	Tek doz (daha önce aşılanmadı ise)									
Men B ⁵	En az 1 ay arayla 2 doz (daha önce aşılanmadı ise)									
Hepatit A ⁶	En az 6 ay arayla 2 doz									
Suçiçeği ⁶	3 ay arayla 2 doz				En az 1 ay arayla 2 doz					

Adolesanın önceki aşılarının tam olup olmadığı öğrenilmeli ve aşı kayıtlarından kontrol edilmelidir.

-Aşısızsa veya eksik aşıları varsa tamamlanmalıdır (Sosyal Pediatri Derneği Aşısız Çocuklar için Aşı Takvimi Önerisi'ne bakınız). (<https://www.sosyalpediatri.org.tr/assets/files/asi-uygulamalari/au5.pdf>)

¹Td (erişkin tetanos-difteri) aşısının 10 yılda bir pekiştirme dozları yapılmalıdır.

-Takvimde 13 yaşın sonunda uygulanacak olan pekiştirme dozu yerine Tdab (erişkin tip tetanos-difteri-asellüler boğmaca) aşısı önerilir, mümkün değilse Td uygulanır. Daha sonra 10 yıl ara ile pekiştirme dozları Td ya da Tdab olarak uygulanır.

²HPV aşısı hem kız hem erkek 9-14 yaş arası sağlıklı adolesanlarda 6-12 ay arayla 2 doz olarak önerilir (iki doz arasında en az 5 ay olmalıdır).

-HPV aşısı 15. doğum gününden sonra başladığında 0, 2, 6 ay şeması ile 3 doz olarak uygulanır (birinci doz ile ikinci doz arasında minimum süre 4 hafta, ikinci ve üçüncü doz arasında minimum süre 12 hafta, birinci ve üçüncü doz arasında minimum süre 5 aydır).

-HPV aşısının ilk dozunun 15. doğum gününden önce uygulandığı sağlıklı çocuklarda ikinci doz zamanında çocuk 15 yaşına ulaşmış olsa bile aşılama toplam 2 dozla tamamlanır.

³Her yıl influenza sezonunda influenza aşısı önerilir.

-Dokuz yaş ve üzerinde her yıl tek doz olarak uygulanır.

⁴Meningokok ACWY aşısı sağlıklı adolesanlara tek doz olarak önerilir.

-Mevcut bilgilere göre öncesinde yaşına uygun meningokok ACWY aşı dozları tamamlanmış sağlıklı adolesanlarda pekiştirme dozuna gerek yoktur.

⁵Meningokok B aşısı sağlıklı adolesanlara en az 1 ay ara ile 2 doz olarak önerilir.

-Mevcut bilgilere göre öncesinde yaşına uygun meningokok B aşı dozları tamamlanmış sağlıklı adolesanlarda pekiştirme dozuna gerek yoktur.

⁶Hepatit A ve Suçiçeği aşıları eksik olan adolesanların hastalıkları geçirdiklerine ilişkin kanıtları yoksa aşılarının tamamlanması önerilir.

-Hepatit A enfeksiyonuna karşı bağışık olmayan adolesanlara; (yaşına uygun antijen içeriği seçilerek) en az 6 ay ara ile 2 doz hepatit A aşısı önerilir.

-Suçiçeği enfeksiyonuna karşı bağışık olmayan adolesanlara; <13 yaş en az 3 ay arayla 2 doz, ≥13 yaş en az 1 ay ara ile 2 doz suçiçeği aşısı önerilir.

-Ulusal aşı takviminde Hepatit A aşısı "1 Mart 2011", suçiçeği aşısı tek doz olarak "1 Ocak 2012" tarihinden itibaren doğanlara uygulanmaktadır. Bu tarihler göz önünde bulundurularak aşılanma durumu sorgulanmalı ve eksik olan ilgili aşılar tamamlanmalıdır.