



SOSYAL PEDIATRİ DERNEĞİ SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA KONJUGE PNÖMOKOK AŞILARI (KPA13 VE KPA20) ARASINDA GEÇİŞ YAPILMASI DURUMUNDA ÖNERİLEN UYGULAMALAR-22 OCAK 2026

(Bu tablo Derneğimizin BAĞIŞIKLAMA ÇALIŞMA GRUBU üyeleri tarafından Delphi Çalışması verilerine dayanılarak hazırlanmıştır)

Emel GÜR, Gonca KESKİNDEMİRCİ, Meltem DİNLEYİCİ, Filiz ORHON, Feyza KOÇ, Meda KONDOLOT, Ahmet ERGİN

Ülkemizde KPA13 Aşısı Genişletilmiş Bağışıklama Programı Kapsamında Ücretsiz Olarak 2+1 Şema ile Uygulanmaktadır.*³

Rutin önerilen uygulama aşağıdaki tabloda koyu renkli harfler ile belirtilmiştir.

Yaş	Primer seri			Rapel doz	Açıklamalar
2-6 ay** ³	KPA13	KPA13		KPA13	-Genişletilmiş Bağışıklama Programı rutin aşı takvimine göre, risk grubunda değilse, ek doz KPA13/KPA20 aşısına gerek yoktur ¹ . (Risk grubu aşılama önerisi için bakınız Kaynak 4) -KPA20 ile başlanan veya devam edilen uygulamada; en az 4 hafta ara ile 3 primer doz, son dozdan 8 hafta sonra olmak üzere 12-15 aylar arası rapel doz uygulaması önerilmektedir.
	KPA13	KPA13	KPA20	KPA20	
	KPA13	KPA20	KPA20	KPA20	
	KPA20	KPA20	KPA20	KPA20	
7-11 ay	KPA13	KPA13		KPA13	-Primer aşı dozları arasında en az 8 hafta; son doz ile rapel doz arasında en az 8 hafta olmalıdır.
	KPA13	KPA20		KPA20	
	KPA20	KPA20		KPA20	
12-23 ay	KPA13	KPA13			-KPA aşı dozları arasında en az 8 hafta olmalıdır.
	KPA13	KPA20			
	KPA20	KPA20			
24-59 ay	KPA13				-KPA13 ya da KPA20 aşısının tek doz uygulanması önerilir.
	KPA20				

***Risk grubu aşılama sırasında özellikle KPA20 aşısı önerilmektedir.**⁴ Sağlıklı çocuklarda KPA13'den KPA20'ye geçiş yapılabileceği bildirilmekte, şemaya kaldığı yerden devam edilmesi önerilmektedir. Önceki dozları tekrarlamaya gerek yoktur.

Kaynak: 1. Central for Disease Control. Recommended Vaccines for Children Erişim:

<https://www.cdc.gov/pneumococcal/vaccines/children.html>. 2. Standing orders for administering pneumococcal vaccines to children and teens. Erişim:

<https://www.immunize.org/wp-content/uploads/catg.d/p3086.pdf>. 3.T.C. Sağlık Bakanlığı. Erişim:

<https://asi.saglik.gov.tr/bagisiklama-programi-ve-asi-takvimi/asi-takvimi.html> 4. Gür E, Keskindemirci G, Dinleyici M, et al.

Online recommendation schemes for health professionals for immunization practices in children with special conditions: Social Pediatric Association immunization practices. Turk Arch Pediatr. Published online December 4, 2025.

doi:10.5152/TurkArchPediatr.2025.25268T

**** KPA13 Genişletilmiş Bağışıklama Programında 2+1 doz uygulanmakta olup primer aşı dozları arasında en az 8 hafta; son doz ile rapel doz arasında en az 8 hafta olmalıdır. Ulusal takvimimizde KPA13 aşıları 2., 4. ve 12. aylarda uygulanmaktadır.**